

**HACEMOS VACAS
Y CUIDAMOS DE ELLAS!**

LÍNEA VETERINARIA

 **InterGenetics**
HACEMOS VACAS



ANTIBIÓTICOS



CEFTIOZUR

USO:

Mastitis, Neumonías, Metritis,
Endometritis, Patojeras

COMPOSICIÓN:

Ceftiofur 5%

DOSIS:

1ml x 45kg x 3 aplicaciones
cada 24 horas

VÍA DE APLICACIÓN:

Intramuscular o Subcutánea

RETIRO EN LECHE: No

PRESENTACIÓN:

50ml, 100ml y 250ml

ANTIBIÓTICOS



AMOXIN L.A.

USO:

Mastitis, Heridas

COMPOSICIÓN:

Amoxicilina 15%

DOSIS:

1ml x 20kg x 3 aplicaciones

VÍA DE APLICACIÓN:

Intramuscular

RETIRO EN LECHE: 72 horas

PRESENTACIÓN: 100 ml

ANTIBIÓTICOS



BIOFLOR

USO:

Diarreas, Neumonías, Patojeras

COMPOSICIÓN:

Florfenicol 30%

DOSIS:

1ml x 15kg x 2 aplicaciones:
0 y 48 horas

VÍA DE APLICACIÓN:

Intramuscular

RETIRO EN LECHE: 96 horas

PRESENTACIÓN: 100 ml

ANTIBIÓTICOS



MICOZUR

USO:

Neumonías, Patojera,

Queratoconjuntivitis

COMPOSICIÓN:

Tilmicosina 30%

DOSIS:

1ml x 30kg x 1 sola aplicación

VÍA DE APLICACIÓN:

Subcutánea

RETIRO EN LECHE: No se puede

usar en vacas lecheras

PRESENTACIÓN: 100 ml

ANTIBIÓTICOS



OXIZUR L.A.

USO:

Antibiótico De Amplio Espectro
(Para todo)

COMPOSICIÓN:

Oxitetraciclina Dihidrato 20%

DOSIS:

1ml x 10kg x 1 sola aplicación

VÍA DE APLICACIÓN:

Intramuscular

RETIRO EN LECHE: 72 horas

PRESENTACIÓN: 100 ml y 250 ml

ANTIBIÓTICOS



TULAMINE

USO:

Neumonías

COMPOSICIÓN:

Tulatromicina 10%

DOSIS:

2,5ml x 100kg x 1 sola aplicación

VÍA DE APLICACIÓN:

Bovinos: Subcutánea

Porcinos: Intramuscular

RETIRO EN LECHE:

No se puede usar en vacas lecheras.

RETIRO EN CARNE:

Bovinos: 49 días. Porcinos: 8 días

Presentación: 50 ml

ANTIINFLAMATORIOS



FLUMEXINE

USO:

Antiinflamatorio, Antipirético, Analgésico

COMPOSICIÓN:

Meglumina de Flunixin 5g

DOSIS:

1ml x 45kg x 3 aplicaciones

VÍA DE APLICACIÓN:

Endovenosa, Intramuscular

PRESENTACIÓN:

20 ml, 100 ml y 250 ml

ANTIINFLAMATORIOS



FUROZUR D

USO:

Edema de Ubre Post Parto

COMPOSICIÓN:

Furosemida 2g, Dexametasona Fosfato de Sodio 0,063g

DOSIS:

1ml x 40kg x 2 aplicaciones

VÍA DE APLICACIÓN:

Intramuscular o Subcutánea

RETIRO EN LECHE: 72 horas**PRESENTACIÓN:** 25 ml

INTRAMAMARIOS



CEFTIOMASTIN

USO:

Mastitis

COMPOSICIÓN:

Ceftiofur 1,25g

DOSIS:

Un inyector a las 0, 24 y 48 horas (Total 3 inyectores)

VÍA DE APLICACIÓN:

Cuarto afectado

RETIRO EN LECHE: 72 horas**PRESENTACIÓN:** 24 inyectores

INTRAMAMARIOS



MASTIZUR CL

USO:

Mastitis

COMPOSICIÓN:

Amoxicilina 200mg + Ácido Clavulánico 50mg + Prednisolona 10m

DOSIS:

Un inyector a las 0, 12 y 24 horas (Total 3 inyectores)

VÍA DE APLICACIÓN:

Cuarto afectado

RETIRO EN LECHE: 72 horas**PRESENTACIÓN:** 24 inyectores

INTRAMAMARIOS



INTRASEC PLUS

USO:

Prevención de Mastitis Durante el Período Seco

COMPOSICIÓN:

Cloxacilina Benzatínica 600mg

DOSIS:

1 inyector x cuarto

VÍA DE APLICACIÓN:

Cuarto

RETIRO EN LECHE: Se debe aplicar mínimo 45 días antes del parto

PRESENTACIÓN: 24 Inyectores

INTRAMAMARIOS



ULTRASEAL

USO:

Sello intramamario para evitar mastitis en el período seco

COMPOSICIÓN:

Subnitrato de bismuto 65g

DOSIS:

1 inyector x cuarto

VÍA DE APLICACIÓN:

Cuarto

PRESENTACIÓN: 24 inyectores

HORMONALES



DISPROZUR

USO:

Inducción y sincronización del celo (iatf), disfunciones reproductivas

COMPOSICIÓN:

Progesterona 1g

DOSIS:

Inducción, sincronización y anestro

1 Dispositivo

VÍA DE APLICACIÓN:

Intravaginal

PRESENTACIÓN: 10 unidades

HORMONALES



BUTROFINA

USO:

Quistes, mejorar tasa de concepción, protocolos sincronización

COMPOSICIÓN:

Acetato de Buserelina 0,0042mg

DOSIS:

Quistes 5ml,

mejora concepción 2,5ml al servicio

VÍA DE APLICACIÓN:

Intramuscular, endovenosa, sucutánea

PRESENTACIÓN: 50 ML

HORMONALES



CELOPROST

USO:

Sincronización de celos, post parto piometras, endometritis

COMPOSICIÓN:

D(+) Cloprostenol 0,0075g

DOSIS:

2ml

VÍA DE APLICACIÓN:

Intramuscular

PRESENTACIÓN:

20 ml y 50 ml

HORMONALES



BENZATRIOL

USO:

Inducción y sincronización de celos (iatf), disfunciones reproductivas

COMPOSICIÓN:

Estradiol Benzoato 100mg,

Clorobutanol anhidro 500mg

DOSIS:

Anestro vacas 10ml,

Anestro vaconas 3ml,

Placenta retenida 4ml

VÍA DE APLICACIÓN:

Intramuscular o Subcutánea

PRESENTACIÓN: 50ml y 100ml

HORMONALES



CONTRACTYL

USO:

Pujo al parto, expulsión placenta, bajada de leche

COMPOSICIÓN:

Oxitocina Sintética 10UI/ml

DOSIS:

3-5ml pujo y expulsión placenta,

1-2ml Bajada de leche

VÍA DE APLICACIÓN:

Intramuscular o Subcutánea

PRESENTACIÓN:

50 ml

IMPLEMENTOS IA



SLINE

USO:

Gel lubricante para uso de maniobras obstétricas u otro tipo de procedimiento veterinario

GEL NO ESPERMICIDA

PRESENTACIÓN: 200 ml

IMPLEMENTOS IA



CELO CHECK (FLUO)

USO:

Detección de celo o manejo de animales

DOSIS:

Para detección de celo pintar una franja aprox. 5 centímetros de ancho sobre la espina dorsal hasta la base de la cola.

VÍA DE APLICACIÓN:

Uso externo exclusivamente

PRESENTACIÓN: 500ml

MINERALES Y VITAMÍNICOS



FOSFOMAX D3

USO:

Mejorar conversión de alimento cuando hay alta fibra en la dieta, anestro, reducir días abiertos, disminuir celos silenciosos, mejorar tasa de concepción.

COMPOSICIÓN:

Glicerofosfato de Sodio anhidro 10g, Vitamina D3 Colecalciferol 500.000UI, Hiposfosfato de Sodio Mono hidrato 10g.

DOSIS:

Ternero(a)s: 5-10ml, Novillos y Fierros: 10-15ml, Vacas y Toros: 15-20ml.

De forma preventiva se puede aplicar cada 60-90 días.

De forma curativa repetir a los 7 días y luego cada 15 o 30 días. Bajo el criterio de un profesional.

VÍA DE APLICACIÓN:

Intramuscular o Subcutánea

PRESENTACIÓN:

100 ml, 250 ml y 500 ml

MINERALES Y VITAMÍNICOS



CUPRIXIN

USO:

Patojeras, Berrugas, Hongos, Anestro, Mejorar tasa de concepción, Disminuir muertes embrionarias, Levantar defensas.

COMPOSICIÓN:

Edetato Cúprico Sódico 9,4gr

DOSIS:

1ml x 50kg hasta los 200kg, sobre los 200 kg 1ml x 100kg.

Dosis máxima vacas 5 ml, Dosis máxima toros 6 ml.

VÍA DE APLICACIÓN:

Subcutánea

PRESENTACIÓN:

100 ml, 250 ml y 500 ml

MINERALES Y VITAMÍNICOS



GLUCOMAG

USO:

Hipocalcemia, Hipomagnesemia, Hipofosfatemia, Acetonemia.

COMPOSICIÓN:

Gluconato de Calcio 15g, Hipofosfito de Magnesio 5g, Glucosa 20g, entre otros.

DOSIS:

500-1.000ml, se puede repetir cada 6-8 horas.

VÍA DE APLICACIÓN:

Endovenosa lenta

PRESENTACIÓN: 500ml



NUESTRO EQUIPO



CESAR ZURITA
Gerente Comercial
099 763 7216



MIREYA VIVANCO
Área Administrativa
098 458 7277



CAROLINA VIVANCO
Área Administrativa
099 966 0441



OSWALDO CEDEÑO
Logística
098 038 5655

ASESORES GENÉTICOS



JAVIER HEREDIA
Asesor Genético
099 242 7744



CARLOS VELASCO
Asesor Genético
099 008 5170



RUBÉN YANEZ
Asesor Genético
099 195 2921



DARÍO LLUMIQUINGA
Asesor Genético
096 848 3347



BRAYAN RUIZ
Asesor Comercial
098 145 0554

DISTRIBUIDORES

DR. OSMANI ARMIJOS
0989 796 769
EL ORO

DR. JHON MONTENEGRO
0991 199 209
PASTAZA-MORONA SANTIAGO-
ZAMORA CHINCHIPE



www.facebook.com/intergenetics



www.instagram.com/intergeneticsec/



<https://www.youtube.com/@intergenetics4437>



099 801 6091

www.intergenetics.net